

**F**

## AQUADROP 2<sup>+</sup>

**AQUADROP 2<sup>+</sup>** est une solution ophtalmique stérile à pH physiologique, basée sur une technologie brevetée d'Acide Hyaluronique (AH) réticulé (AH) avec de l'Urée, de ce fait permettant de renforcer et d'améliorer les propriétés mécaniques spécifiques de l'AH natif, résistant à la dégradation des hyaluronidases pendant une période plus longue que l'AH natif avec ainsi une action lubrifiante et hydratante supérieure et prolongée en comparaison avec l'AH natif. La structure du réseau d'hydratation de l'AH réticulé est capable d'apporter de l'eau pour une période prolongée améliorant les propriétés lubrifiantes de l'AH natif tout en boostant ses effets hydratants, il est donc indiqué comme adjuvant dans les cas du syndrome de l'œil sec. L'AH réticulé fournit au produit des propriétés lubrifiantes, hydratantes et réparatrices, capables de soulager la sécheresse oculaire due au syndrome de l'œil sec, de l'œil irrité ou fatigué en cas de conditions d'inflammations ou de facteurs environnementaux. La formule a été développée pour assurer un confort maximum dès l'application. Elle peut s'utiliser tous les jours, de jour comme de nuit. Elle ne contient pas de conservateur et/ou molécules avec des actions anti-inflammatoires et vasoconstrictrices. **AQUADROP 2<sup>+</sup>** peut s'utiliser avec des lentilles de contact.

### UTILISATION PRÉVUE

#### **AQUADROP 2<sup>+</sup> est indiqué :**

- Pour le rétablissement et l'amélioration de la stabilité du film lacrymal dans le syndrome de l'œil sec ;
- Après une chirurgie réfractive ;
- Pour soulager les yeux en cas de rougeurs, de fatigue et de gêne dans l'œil ou de la muqueuse oculaire due à :
  - des facteurs environnementaux (climatisation, exposition excessive au rayonnement solaire, au vent, à la fumée, à la pollution, à l'eau de mer ou de piscine et au sel séché) ;
  - la sécheresse oculaire due à une fatigue excessive causée par un travail prolongé sur ordinateur, de longues périodes d'étude ;
  - anomalies lacrymales suite à des inflammations, une blépharite chronique ;
  - anomalies lacrymales suite à une chirurgie oculaire de nature diverse ou chirurgie esthétique de la paupière ;
  - port de lentilles de contact rigides ou semi rigides.

### COMPOSITION

Solution aqueuse de polymère croisé d'hyaluronate de sodium (dont hyaluronate de sodium croisé 0,4%), trométamol, acide chlorhydrique (2N), chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. Sans conservateur.

### MODE D'EMPLOI

- Lavez et séchez soigneusement vos mains avant toute utilisation ;
- Ouvrez le sachet aluminium de protection.
- Détachez la dose individuelle de la bandelette ;
- Tournez et retirez le bouchon pour briser le sceau ;
- Posez le bouchon sur une surface propre ;
- Administrez 2 gouttes dans chaque œil en pressant légèrement le contenant de la dose individuelle, sauf prescription contraire ;
- Après utilisation, refermez immédiatement le contenant de la dose individuelle et utilisez le contenu dans les 12 heures.

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Le produit est destiné à un usage individuel ;
- Le produit est exclusivement destiné à un usage ophtalmique ;
- Ne pas utiliser le produit si le sachet aluminium est endommagé ou si la dose individuelle n'a pas été correctement fermée ;
- Ne l'utilisez pas si des particules sont visibles et/ou si la couleur de la solution change ;
- Pendant l'application, ne touchez pas vos yeux ou toute autre surface avec le compte-gouttes du contenant ;
- N'utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage et sur la dose individuelle.
- En cas d'effets secondaires pendant l'utilisation, interrompez le traitement et consultez un médecin ;
- Ne pas utiliser en cas d'incompatibilité avec les composants de la solution ;
- Aucune interaction avec des médicaments ou d'autres collyres n'a été signalée ; toutefois, il convient d'attendre au moins 15 minutes entre l'administration de tout autre collyre ;
- Mettez le produit au rebut conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets ;
- Tenez-le hors de portée et de vue des enfants ;
- Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez ;
- Le produit est destiné à un usage externe, ne pas avaler ;
- Il est nécessaire de signaler tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

## EFFETS SECONDAIRES

Immédiatement après avoir été administré, le produit peut engendrer une vision floue temporaire due à la viscosité de la solution. Il est donc recommandé d'attendre quelques secondes avant de faire une activité nécessitant une vision claire.

## CONDITIONS DE CONSERVATION

À conserver entre 2°C et 30°C dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'exposition à la lumière directe du soleil. Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture. Stockez les autres doses individuelles dans le sachet aluminium fourni jusqu'à la prochaine utilisation.

## EMBALLAGE

30 doses individuelles refermables de 0,5 ml.

## VALIDITÉ

Si l'emballage n'est pas ouvert : ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur la boîte et sur la dose individuelle.



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.  
Via Modena, 15 - 40019  
Sant'Agata Bolognese (BO)  
Italy



Precilens 25 rue Auguste Perret  
94000 Créteil

Last revision date: 02.01 of 10/2022

**F**

## AQUADROP 2<sup>+</sup>

**AQUADROP 2<sup>+</sup>** est une solution ophtalmique stérile à pH physiologique, basée sur une technologie brevetée d'Acide Hyaluronique (AH) réticulé (AH) avec de l'Urée, de ce fait permettant de renforcer et d'améliorer les propriétés mécaniques spécifiques de l'AH natif, résistant à la dégradation des hyaluronidases pendant une période plus longue que l'AH natif avec ainsi une action lubrifiante et hydratante supérieure et prolongée en comparaison avec l'AH natif. La structure du réseau d'hydratation de l'AH réticulé est capable d'apporter de l'eau pour une période prolongée améliorant les propriétés lubrifiantes de l'AH natif tout en boostant ses effets hydratants, il est donc indiqué comme adjuvant dans les cas du syndrome de l'œil sec. L'AH réticulé fournit au produit des propriétés lubrifiantes, hydratantes et réparatrices, capables de soulager la sécheresse oculaire due au syndrome de l'œil sec, de l'œil irrité ou fatigué en cas de conditions d'inflammations ou de facteurs environnementaux. La formule a été développée pour assurer un confort maximum dès l'application. Elle peut s'utiliser tous les jours, de jour comme de nuit. Elle ne contient pas de conservateur et/ou molécules avec des actions anti-inflammatoires et vasoconstrictrices. **AQUADROP 2<sup>+</sup>** peut s'utiliser avec des lentilles de contact.

### UTILISATION PRÉVUE

#### **AQUADROP 2<sup>+</sup> est indiqué :**

- Pour le rétablissement et l'amélioration de la stabilité du film lacrymal dans le syndrome de l'œil sec ;
- Après une chirurgie réfractive ;
- Pour soulager les yeux en cas de rougeurs, de fatigue et de gêne dans l'œil ou de la muqueuse oculaire due à :
  - des facteurs environnementaux (climatisation, exposition excessive au rayonnement solaire, au vent, à la fumée, à la pollution, à l'eau de mer ou de piscine et au sel séché) ;
  - la sécheresse oculaire due à une fatigue excessive causée par un travail prolongé sur ordinateur, de longues périodes d'étude ;
  - anomalies lacrymales suite à des inflammations, une blépharite chronique ;
  - anomalies lacrymales suite à une chirurgie oculaire de nature diverse ou chirurgie esthétique de la paupière ;
  - port de lentilles de contact rigides ou semi rigides.

### COMPOSITION

Solution aqueuse de polymère croisé d'hyaluronate de sodium (dont hyaluronate de sodium croisé 0,4%), trométamol, acide chlorhydrique (2N), chlorure de sodium, eau pour préparations injectables. Sans conservateur.

### MODE D'EMPLOI

- Lavez et séchez soigneusement vos mains avant toute utilisation ;
- Ouvrez le sachet aluminium de protection.
- Détachez la dose individuelle de la bandelette ;
- Tournez et retirez le bouchon pour briser le sceau ;
- Posez le bouchon sur une surface propre ;
- Administrez 2 gouttes dans chaque œil en pressant légèrement le contenant de la dose individuelle, sauf prescription contraire ;
- Après utilisation, refermez immédiatement le contenant de la dose individuelle et utilisez le contenu dans les 12 heures.

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Le produit est destiné à un usage individuel ;
- Le produit est exclusivement destiné à un usage ophtalmique ;
- Ne pas utiliser le produit si le sachet aluminium est endommagé ou si la dose individuelle n'a pas été correctement fermée ;
- Ne l'utilisez pas si des particules sont visibles et/ou si la couleur de la solution change ;
- Pendant l'application, ne touchez pas vos yeux ou toute autre surface avec le compte-gouttes du contenant ;
- N'utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage et sur la dose individuelle.
- En cas d'effets secondaires pendant l'utilisation, interrompez le traitement et consultez un médecin ;
- Ne pas utiliser en cas d'incompatibilité avec les composants de la solution ;
- Aucune interaction avec des médicaments ou d'autres collyres n'a été signalée ; toutefois, il convient d'attendre au moins 15 minutes entre l'administration de tout autre collyre ;
- Mettez le produit au rebut conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets ;
- Tenez-le hors de portée et de vue des enfants ;
- Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez ;
- Le produit est destiné à un usage externe, ne pas avaler ;
- Il est nécessaire de signaler tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

## EFFETS SECONDAIRES

Immédiatement après avoir été administré, le produit peut engendrer une vision floue temporaire due à la viscosité de la solution. Il est donc recommandé d'attendre quelques secondes avant de faire une activité nécessitant une vision claire.

## CONDITIONS DE CONSERVATION

À conserver entre 2°C et 30°C dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'exposition à la lumière directe du soleil. Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture. Stockez les autres doses individuelles dans le sachet aluminium fourni jusqu'à la prochaine utilisation.

## EMBALLAGE

30 doses individuelles refermables de 0,5 ml.

## VALIDITÉ

Si l'emballage n'est pas ouvert : ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur la boîte et sur la dose individuelle.



0051

MD

# DT/01/DT/010

STERILE A



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.  
Via Modena, 15- 40019  
Sant'Agata Bolognese (BO)  
Italy



Precilens 25 rue Auguste Perret  
94000 Créteil

Last revision date: 02.01 of 10/2022